

## Annexe 2

### Objectifs de formation pour les médecins de famille

Le catalogue des objectifs de formation destiné au «cursus pour les médecins de famille» contient toutes les connaissances que les candidats doivent impérativement acquérir pour exercer leur profession dans le cadre de la médecine de famille. Ce catalogue complète les catalogues suivants:

- le catalogue des objectifs de la formation postgraduée de base (annexe 1)
- le catalogue des «Objectifs de formation généraux», valable en tant qu'annexe de la Réglementation pour la formation postgraduée pour tous les programmes de formation postgraduée en vue d'un titre de spécialiste et qui décrit les objectifs de formation importants pour le médecin de famille comme pour les experts médicaux / responsables de la communication / collaborateurs de l'équipe / gestionnaires / responsables de la promotion de la santé / scientifiques (y c. enseignants et chercheurs) / représentants de la profession et
- le catalogue des objectifs de formation axés sur les symptômes ainsi que le plan-cadre pour le cours de médecin de garde FMH / SSMUS.

#### Le médecin de famille ...

#### A. Symptômes et troubles généraux «non spécifiques», douleurs impossibles à déterminer de façon précise

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections non spécifiques</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée à d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs généralisées ou localisées à plusieurs endroits</b> (douleurs chroniques généralisées de type général, douleurs continues à plusieurs endroits)</li> <li>- <b>Douleurs dans une région du corps</b> (thorax, abdomen, tête, jambes, crampes au mollet)</li> <li>- <b>Frissons</b> (frissons, sueur froide)</li> <li>- <b>Fièvre</b> (p. ex. pyrexie)</li> <li>- <b>Faiblesse générale ou fatigue</b> (syndrome d'épuisement, abattement, léthargie, malaise, syndrome de fatigue post-virale)</li> <li>- <b>Indisposition</b> (mal-être ou malaise)</li> <li>- <b>Syncope et perte de connaissance</b> (black-out, collaps sans perte de connaissance, syncope)</li> <li>- <b>Tuméfaction</b> (nodules ou masse tissulaire sans définition détaillée)</li> <li>- <b>Transpiration</b> (hyperhidrose, sueurs nocturnes, problèmes de transpiration)</li> <li>- <b>Soucis ou craintes concernant un traitement médical</b></li> <li>- <b>Facteurs de risque pour des néoformations malignes</b> (néoformations malignes dans l'anamnèse personnelle et l'anamnèse familiale, traitement(s) ancien(s), autres facteurs de risque pour des affections malignes)</li> <li>- <b>Facteurs de risque en général pour une maladie</b> (contact avec un foyer d'infection, anamnèse personnelle ou anamnèse familiale, traitement ancien ou autre facteur de risque pour d'autres maladies)</li> <li>- <b>Peur de la mort, de mourir</b></li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b> Crainte d'un cancer, du virus VIH, d'une maladie vénérienne ou d'une autre grave maladie</b> chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée</li> <li>- <b> Fonction corporelle restreinte ou perturbée</b></li> <li>- <b> Autres symptômes et maux généraux</b> (maladresse, hébétéude, déséquilibre, douleur non spécifiée)</li> <li>- <b> Aucune maladie</b> (le patient formule parfois une demande que le médecin de famille ne peut pas considérer comme un diagnostic dans le cadre de la médecine générale. Le médecin de famille doit alors dire au patient qu'il ne peut pas lui répondre de manière professionnelle et en expliquer les raisons).</li> </ul>
--	---

## B. Maladies et diagnostics généraux «non spécifiques»

<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics spéciaux généraux</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses, prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée à d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Empoisonnement par un médicament</b> (drogues entraînant la dépendance, effet toxique d'une surdose médicamenteuse)</li> <li>- <b>Effets nocifs d'un médicament correctement dosé</b> (effets secondaires, allergies et anaphylaxie)</li> <li>- <b>Effet toxique d'une substance non médicale</b> (monoxyde de carbone; effets généraux ou locaux; matériaux industriels; plomb; plantes, animaux venimeux tels qu'insectes ou serpents)</li> <li>- <b>Complications lors d'un traitement médical</b> (choc anesthésique; réactions à des vaccinations ou des transfusions; apparition postopératoire de plaies, infection, saignement; problèmes consécutifs à une radiation effectuée dans un but diagnostique ou thérapeutique)</li> <li>- <b>Effets nocifs de facteurs physiques</b> (coup de froid; engelures; noyage; coup de chaleur; jetlag; électricité, foudre y compris; mouvement, pression; radiation)</li> <li>- <b>Anomalie congénitale</b> (syndrome de Down, syndrome de Marfan; neurofibromatose; autres anomalies chromosomiques)</li> <li>- <b>Résultats inhabituels d'examen</b> (constat pathologique ou résultat inhabituel et inexplicable d'une radiographie; trouble électrolyte; hyperglycémie)</li> <li>- <b>Décès</b></li> <li>- <b>Maladie ou maux d'origine et de localisation indéterminées</b> (patient porteur d'une maladie; observation de l'évolution)</li> </ul>
--	--

## C. Prévention de la santé et médecine préventive

<p>...peut <b>conseiller et recommander des mesures médicales</b> avec un objectif primaire ou secondaire préventif, y</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Examens préventifs, prévention des carcinomes du côlon, de la prostate, des seins, de l'utérus</b></li> <li>- <b>Demande d'un check up</b></li> <li>- <b>Désintoxication du tabac</b></li> </ul>
--	--

<p>compris le conseil génétique:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Désintoxication de l'alcoolisme</b></li> <li>- <b>Désintoxication des drogues</b> (y compris substitution par la méthadone)</li> <li>- <b>Désintoxication médicamenteuse</b></li> <li>- <b>Alimentation et comportement alimentaire</b></li> <li>- <b>Mouvement et sport</b></li> <li>- <b>Loisirs</b></li> <li>- <b>Equilibre du mode de vie et prophylaxie du burn-out</b></li> <li>- <b>Stress et symptômes dus au stress</b></li> <li>- <b>Vaccinations</b></li> <li>- <b>Conseils pour les voyages</b></li> <li>- <b>Examens médicaux en milieu scolaire</b></li> <li>- <b>Capacité à la conduite automobile</b></li> <li>- <b>Fitness et médecine du sport</b> (éléments principaux des différentes sortes de sports et charge corporelle, centres de fitness ...)</li> </ul>
--------------------------------------	---

#### D. Problèmes sociaux

<p>...peut, pour ces <b>problèmes, symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Soucis dus à la pauvreté ou à des problèmes financiers</b></li> <li>- <b>Problèmes concernant l'alimentation, l'eau, le logement</b></li> <li>- <b>Problèmes avec les voisins</b></li> <li>- <b>Problèmes sociaux dus à des facteurs culturels</b></li> <li>- <b>Grossesse extra-conjugale</b></li> <li>- <b>Problèmes migratoires</b></li> <li>- <b>Problèmes liés au poste de travail</b></li> <li>- <b>Absentéisme</b> (école, poste de travail)</li> <li>- <b>Problèmes dus au chômage</b></li> <li>- <b>Problèmes de formation</b> (y c. analphabétisme)</li> <li>- <b>Problèmes avec les services sociaux</b> (assureur-maladie, AVS, services sociaux cantonaux, AI)</li> <li>- <b>Problèmes juridiques</b></li> <li>- <b>Problèmes avec le système de santé</b></li> <li>- <b>Problèmes dus à une maladie ou à un accident</b></li> <li>- <b>Problèmes concernant l'observation (lacunaire) d'un conseil médical</b></li> <li>- <b>Problèmes relationnels avec le/la partenaire</b> (y c. maltraitance émotionnelle)</li> <li>- <b>Violence domestique</b></li> <li>- <b>Problèmes de comportement avec le/la partenaire</b> (y c. infidélité, maltraitance physique)</li> <li>- <b>Problèmes dus à la maladie du partenaire</b></li> <li>- <b>Perte ou décès du partenaire</b> (y c. deuil, divorce, séparation)</li> <li>- <b>Problèmes relationnels avec des enfants</b> (y c. maltraitance émotionnelle des enfants)</li> <li>- <b>Problèmes dus à la maladie d'une enfant</b></li> <li>- <b>Perte ou décès d'un enfant</b></li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Problèmes relationnels avec les parents ou d'autres membres de la famille</b></li> <li>- <b>Problèmes dus au comportement des parents ou d'autres membres de la famille</b></li> <li>- <b>Problèmes dus à la maladie des parents ou d'un autre membre de la famille</b></li> <li>- <b>Perte ou décès d'un parent ou d'un autre membre de la famille</b></li> <li>- <b>Problèmes relationnels avec des amis et des collègues de travail</b></li> <li>- <b>Agression avec lésions corporelles</b> (y c. victime d'une maltraitance physique, d'un viol, d'une agression sexuelle)</li> <li>- <b>Crainte concernant un problème social</b> (chez un patient qui n'avait pas ce problème jusqu'à présent.)</li> <li>- <b>Situation sociale défavorisée</b> (y c. isolement social, vie solitaire)</li> <li>- <b>Autres problèmes sociaux</b> (y c. problèmes avec l'environnement, les nuisances environnementales)</li> </ul>
--	--

## E. Circulation cardio-vasculaire

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs cardiaques</b> (y c. douleurs imputées au cœur par le patient)</li> <li>- <b>Sensation d'oppression dans la région du cœur</b> («cœur lourd» selon le patient)</li> <li>- <b>Palpitations cardiaques, prise en compte d'une crise cardiaque</b> (y c. battements rapides)</li> <li>- <b>Autres irrégularités du battement cardiaque</b></li> <li>- <b>Veines et autres vaisseaux apparents</b> (veines apparentes de manière inhabituelle, spider naevi)</li> <li>- <b>Œdème osseux</b> (hydrops, rétention d'eau, pieds et jambes enflées)</li> <li>- <b>Facteurs de risque pour maladies cardiovasculaires</b> (anamnèse personnelle ou anamnèse familiale, traitement ancien ou autre facteur de risque pour une maladie cardiovasculaire)</li> <li>- <b>Crainte d'un infarctus</b> (peur d'une crise cardiaque chez un patient qui ne présente aucun signe d'infarctus aigu)</li> <li>- <b>Crainte d'une pression sanguine élevée ou d'autres maladies cardiovasculaires</b> (chez un patient qui n'a pas cette maladie)</li> <li>- <b>Fonction cardiovasculaire subjectivement restreinte ou perturbée</b></li> <li>- <b>Autres symptômes ou affections cardiovasculaires</b> (tels qu'affections cardiaques, plainte du patient concernant «une pression sanguine trop basse» ou une «faiblesse cardiaque»)</li> </ul>
---	---

<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Anomalie congénitale dans le domaine cardiovasculaire</b> (telle que défectuosité atriale ou ventriculaire du septum; tétralogie de Fallot; ductus arteriosus Botalli ouvert)</li> <li>- <b>Souffle au cœur ou bruit dans les artères</b> (souffles fonctionnels inoffensifs tels que souffles au cœur, bruit dans l'aorte, autres bruits d'écoulement)</li> <li>- <b>Ischémie cérébrale éphémère</b> (insuffisance basilaire; attaques cérébrales avec chute; attaque ischémique transitoire; amnésie globale passagère, amaurosis fugax)</li> <li>- <b>Autres maladies cardio-vasculaires</b> (anévrisme cérébral, séquelles d'une attaque cérébrale)</li> </ul>
---	--

## F. Voies respiratoires

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs dans les voies respiratoires</b> (respiration douloureuse, douleur pleurale, pleurodynie)</li> <li>- <b>Essoufflement, dyspnée</b> (y c. orthopnée)</li> <li>- <b>Rhonchus, spasme bronchial</b> (respiration sifflante ou bruyante)</li> <li>- <b>Ronflements</b></li> <li>- <b>Problèmes respiratoires</b> (pauses respiratoires allongées, syndrome Respiratory-Distress, stridor, tachypnée)</li> <li>- <b>Toux, avec ou sans expectoration</b></li> <li>- <b>Saignements du nez</b></li> <li>- <b>Eternuements, respiration nasale entravée, rhinorrhée</b></li> <li>- <b>Autres symptômes et affections du nez</b> (drip post-nasal, nez enflé, nez rouge)</li> <li>- <b>Douleurs ou pression dans les sinus nasaux</b></li> <li>- <b>Symptômes et affections du cou et de la gorge</b> (gorge sèche ou rouge, gorge irritée, amygdales volumineuses, douleurs au cou et dans la gorge, douleurs aux amygdales, sentiment de boule)</li> <li>- <b>Perte de la voix, enrouement</b></li> <li>- <b>Hémoptyse ou toux avec crachats sanguins</b></li> <li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou d'une autre maladie des voies respiratoires</b> (chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée.)</li> <li>- <b>Fonction des voies respiratoires subjectivement restreinte ou perturbée</b> (entrave consécutive à une hypoxie, hypercapnie, fonction pulmonaire limitée à la suite de maladies des voies respiratoires, du nez, du larynx ou de la gorge)</li> <li>- <b>Autres symptômes et affections des voies respiratoires</b> (oppression dans la cage thoracique, liquide dans les poumons, hoquet, congestion pulmonaire)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiel-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Coqueluche</b> (y c. syndrome parapertussis, pertussis)</li> <li>- <b>Furoncle ou abcès dans la région nasale</b> (infection nasale localisée)</li> <li>- <b>Amygdalite aiguë</b> (y c. abcès périamygdalite)</li> <li>- <b>Pleurésie, épanchement pleural</b> (y c. exsudat enflammé,</li> </ul>

<p>lement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<p>pleurésie sèche ou humide)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autres infections des voies respiratoires</b> (nasopharyngite chronique; pharyngite chronique; rhinite chronique; infections fongiques des voies respiratoires; infections protozoaires; abcès pulmonaire; épiglotte; empyème)</li> <li>- <b>Néoformation bénigne dans les voies respiratoires</b></li> <li>- <b>Corps étranger dans le nez, le larynx ou les bronches</b></li> <li>- <b>Blessure au nez ou dans les voies respiratoires</b></li> <li>- <b>Anomalies génétiques des voies respiratoires</b> (nez, gorge, voies respiratoires, larynx, bronches, poumons ou plèvre)</li> <li>- <b>Hypertrophie des amygdales palatines ou de la gorge</b> (y c. coqueluche chronique)</li> <li>- <b>Rhinite allergique</b> (rhume des foins, rhinite vasomotrice)</li> <li>- <b>Syndrome d'hyperventilation</b></li> <li>- <b>Autres maladies des voies respiratoires</b> (pneumonie d'aspiration; polypes nasaux; atélectasie)</li> </ul>
--	---

## G. Digestion, y c. bouche, dents

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs ou crampes dans l'abdomen</b> (colique, crampes, malaise, douleurs dans l'abdomen; colique infantile)</li> <li>- <b>Douleurs dans l'abdomen supérieur [épigastre]</b> (malaise dans la partie supérieure de l'abdomen, sentiment de réplétion; douleurs abdominales)</li> <li>- <b>Brûlures gastriques</b> (hyperacidité, pyrose), rejets acides</li> <li>- <b>Douleurs dans le rectum ou l'anus</b> (spasme anal, proctalgia fugax)</li> <li>- <b>Démangeaisons dans la région anale [pruritus ani]</b></li> <li>- <b>Autres douleurs localisées dans l'abdomen</b> (y c. douleurs dans le côlon)</li> <li>- <b>Indigestion, embarras gastrique</b></li> <li>- <b>Flatulence, météorisme, éructation</b> (météorisme; éructation; douleurs dues aux flatulences; abdomen gonflé; vents cassés)</li> <li>- <b>Nausée [nausea]</b></li> <li>- <b>Vomissements</b> (émesis, hyperémesis, étranglements/nausées)</li> <li>- <b>Diarrhée</b> (défécation fréquente ou liquide, selles aqueuses)</li> <li>- <b>Constipation</b> (y c. impaction fécale)</li> <li>- <b>Jaunisse [ictère]</b></li> <li>- <b>Hépatomégalie</b></li> <li>- <b>Hématémèse</b></li> <li>- <b>Melaena</b></li> <li>- <b>Saignement rectal</b> [sang frais dans les selles]</li> <li>- <b>Incontinence intestinale</b> [incontinence fécale]</li> <li>- <b>Modifications des selles ou lors de la défécation</b></li> </ul>
---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Masse tissulaire dans l'abdomen</b> [tuméfaction dans l'abdomen]</li> <li>- <b>Abdomen gonflé</b> [tuméfaction de l'abdomen sans masse tissulaire]</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou d'une autre maladie du tube digestif</b> (chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction restreinte ou perturbée du système digestif</b></li> <li>- <b>Autres symptômes ou affections dans la région du tube digestif</b> (y c. ascite, grincements des dents)</li> <li>- <b>Symptômes ou affections des dents et des gencives</b> (problème avec le remplacement des dents, inflammation, hyperplasie et saignement des gencives, dents, douleurs dentaires)</li> <li>- <b>Symptômes ou affections dans la bouche, sur la langue ou les lèvres</b> (mauvaise haleine; langue chargée; glossopyrose; lèvres gercées; salivation; bouche sèche; halitose (haleine fétide); lèvres enflées; inflammation de la muqueuse buccale, aphtes)</li> <li>- <b>Dysphagie</b> (y c. sensation d'étouffement, dysphagie, sensation d'avoir une boule dans la gorge)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Corps étranger dans le tube digestif</b> (corps étranger dans la bouche, l'œsophage, le rectum; aliment avalé de travers)</li> <li>- <b>Anomalie congénitale du tube digestif</b> (anomalie des voies biliaires; bec-de-lièvre, bec-de-lièvre bilatéral total; diverticule de Meckel; mégacôlon, maladie de Hirschsprung; atrésie de l'œsophage; sténose du pylore; paralysie de la langue)</li> <li>- <b>Fissure anale, abcès périanal</b> (y c. fistule dans l'anus, abcès ischio-rectal)</li> <li>- <b>Vers ou autres parasites</b> (y c. ver solitaire; larva migrans cutanea; parasites intestinaux non spécifiques; trichinose, affection due à une hydatide)</li> <li>- <b>Autres maladies du système digestif</b> (adhérences abdominales; syndrome de dumping; iléus; maladie intestinale obstructive; maladie des vaisseaux mésentériques; péritonite; mégacôlon secondaire; sprue)</li> <li>- <b>Affection dentaire ou des gencives</b> (caries; abcès parodontal; inflammation des gencives; anomalie de la denture; troubles de l'articulation temporo-maxillaire)</li> <li>- <b>Maladies de la bouche, de la langue ou des lèvres</b> (ulcus aphteux; cheilosis; glossite; mucocèle; parotide; stomatite ulcéreuse; pierres dans les glandes et voies salivaires; stomatite; angine de Plaut-Vincent, angine à streptocoques)</li> </ul>

## H. Appareil locomoteur

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Douleurs</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>dans la nuque</b> (douleurs à la colonne cervicale ou aux muscles cervicaux)</li><li>• <b>dans le dos</b> (douleurs à la colonne dorsale)</li><li>• <b>dans les reins</b> (douleurs dans la région de la colonne lombaire, articulation au niveau des reins ou de l'aile iliaque; coccygodynie)</li><li>• <b>dans la poitrine</b> (y c. douleurs dans la cage thoracique, attribuées à la musculature)</li><li>• <b>à la mâchoire</b> (y c. symptômes dans l'articulation temporo-maxillaire)</li><li>• <b>dans les épaules</b></li><li>• <b>dans un bras ou dans les bras</b></li><li>• <b>au coude</b></li><li>• <b>au poignet</b></li><li>• <b>dans les mains et les doigts</b></li><li>• <b>à une hanche ou aux deux hanches, y c. les cuisses</b></li><li>• <b>au genou</b></li><li>• <b>à l'articulation de la malléole et de la cheville</b></li><li>• <b>dans les pieds, les doigts de pied</b> (y c. métatarsalgie)</li></ul></li><li>- <b>Douleurs musculaires</b> (fibrosite, fibromyalgie, myalgie, rhumatisme)</li><li>- <b>Autres symptômes et affections musculaires</b> (raideur musculaire; myoatrophie (diminution de la masse musculaire); surtension musculaire; faiblesse musculaire)</li><li>- <b>Symptômes et affections dans d'autres articulations</b> (p.ex. arthralgie, épanchement dans l'articulation, douleurs dans la région articulaire, raideur articulaire, tuméfaction articulaire, faiblesse articulaire)</li><li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou d'une autre maladie de l'appareil locomoteur</b> (chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée)</li><li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée de l'appareil locomoteur</b></li><li>- <b>Autres symptômes ou affections de l'appareil locomoteur</b> (p.ex. douleurs dues à la croissance chez les enfants; situations non éclaircies dans l'appareil locomoteur)</li></ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Maladies infectieuses de l'appareil locomoteur</b> (inflammation infectieuse des gaines synoviales tendineuses; ostéomyélite; arthrite à pyogène)</li><li>- <b>Néoformations bénignes de l'appareil locomoteur</b></li><li>- <b>Anomalie congénitale de l'appareil locomoteur</b> (p. ex. jambes O/X; pied bot; luxation congénitale de la hanche; genu recurvatum; malformations du crâne et du visage; autres malformations congénitales du pied)</li><li>- <b>Syndrome cervical</b> (mal de tête cervical; syndrome avec ou sans douleurs rayonnantes; affections des ligaments dans la région cervicale; syndrome cervicobrachial; ostéoarthrite; syndrome radiculaire des extrémités supé-</li></ul>



	<p>rieures; spondylose; distorsions et foulures; torticoli)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Déformation acquise de la colonne vertébrale</b> (cyphoscoliose, cyphose, scoliose, lordose)</li> <li>- <b>Bursite, tendinite, synovite</b> (éperon osseux, tendons calcifiés, contraction de Dupuytren, fascite, ganglion; kystes synoviaux; synovite; doigt à ressort)</li> <li>- <b>Syndrome à l'épaule et au bras</b> (bursite des épaules; frozen shoulder; ostéoarthrose; syndrome des manchettes de rotation; synovite des épaules; tendinite des épaules)</li> <li>- <b>Tennis elbow</b> (épicondylite médiale / latérale)</li> <li>- <b>Ostéochondrose</b> (maladie de Perthes-Legg-Calvé; maladie d'Osgood/Schlatter; ostéochondrite disséquante; maladie de Scheuermann; épiphysiolyse de la cuisse)</li> <li>- <b>Déformation acquise des membres</b> (pieds de footballeur; genu valgum et varum; hallux valgus et varus; orteil en marteau; pied plat, pied creux)</li> <li>- <b>Autres maladies de l'appareil locomoteur</b> (affection interne chronique du genou; contractions; syndrome de Tietze; dermatomyosite; affection de la rotule; myosite; panniculite; polymyalgie rhumatismale)</li> </ul>
--	---

## I. Chirurgie, orthopédie, traumatologie

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Contusion</b> (y c. hématome, ecchymose [surface supérieure intacte de la peau])</li> <li>- <b>Ecorchure, éraflures, formation traumatique de cloques</b> (y c. contusion avec peau fissurée, excoriation, éraflures)</li> <li>- <b>Autres affections cutanées</b> (y c. arrachage d'un ongle, piqûre d'aiguille, piqûre d'insecte)</li> <li>- <b>Corps étranger dans la peau ou sous les ongles</b></li> <li>- <b>Morsure d'un animal ou d'une personne</b></li> <li>- <b>Infection posttraumatique d'une plaie ou d'une morsure</b></li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Traumatisme ou blessure, p. ex. après un accident de la circulation</b></li> <li>- <b>Polytraumatisme</b> (aussi lésions internes)</li> <li>- <b>Coxarthrose</b> (ostéoarthrite; secondaire résultant d'une dysplasie, d'un traumatisme)</li> <li>- <b>Gonarthrose</b> (ostéoarthrite, secondaire résultant d'une dysplasie, d'un traumatisme)</li> <li>- <b>Omarthrose</b> (ostéoarthrite, secondaire résultant d'une dysplasie, d'un traumatisme)</li> <li>- <b>Arthrose du pied et de la cuisse</b></li> <li>- <b>Autre arthrose</b>, (y c. nodules de Heberden; arthropathie traumatique)</li> <li>- <b>Fracture d'un os de la main ou du pied</b> (os carpien, os métacarpien, doigt, orteil, os tarsien, os métatarsien)</li> <li>- <b>Fracture du radius ou du cubitus</b> (y c. fractures radii loco classico)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Fracture de l'humérus</b></li><li>- <b>Fracture du tibia ou du péroné (fibule)</b></li><li>- <b>Fracture du fémur</b> (y c. fracture du col du fémur)</li><li>- <b>Fracture de l'os du nez</b></li><li>- <b>Fracture du crâne</b></li><li>- <b>Autre fracture</b></li><li>- <b>Fracture pathologique</b></li><li>- <b>Fractures guérissant mal ou pas du tout</b></li><li>- <b>Arthrodèse</b></li><li>- <b>Entorse, luxation, distorsion de la main ou de doigts</b></li><li>- <b>Entorse, luxation, distorsion d'un bras, du coude ou de l'épaule</b></li><li>- <b>Entorse, luxation, distorsion d'un pied ou d'orteils</b></li><li>- <b>Entorse, luxation, distorsion du genou</b> (y c. lésion aiguë du ménisque ou des ligaments croisés)</li><li>- <b>Entorse, luxation, distorsion d'une autre articulation</b> (y c. syndrome du coup-du-lapin)</li><li>- <b>Luxation de l'épaule</b></li><li>- <b>Dislocations et subluxations</b> (aussi de la colonne vertébrale)</li><li>- <b>Traitement des plaies, y c. soins et contrôles ultérieurs</b></li><li>- <b>Fissure spontanée ou traumatique des tendons</b></li><li>- <b>Autre blessure de l'appareil locomoteur</b> (p.ex. corps étranger profondément introduit; hémarthrose; amputation traumatique)</li><li>- <b>Séquelles secondaires d'un traumatisme</b> (déformations, cicatrices résultant d'une blessure antérieure; amputation ancienne)</li><li>- <b>Effets d'une prothèse</b> (incommodation, entrave, douleur ou capacité fonctionnelle restreinte suite à l'adaptation et/ou au fait de porter une prothèse pour améliorer ou corriger des lacunes corporelles; colostomie; cathéter; gastrostomie; valvule cardiaque; remplacement d'une articulation; transplantation d'organe; stimulateur cardiaque)</li><li>- <b>Blessure traumatique dans le tube digestif</b> (lésion d'un organe dans l'abdomen, fissure traumatique de la rate, contusion traumatique du foie, des reins, d'un organe interne, des dents, de la langue)</li><li>- <b>Appendicite</b> (y c. infiltration, perforation)</li><li>- <b>Hernie inguinale</b></li><li>- <b>Autres hernies de l'abdomen</b> (hernie fémorale, omphalocèle, fracture de la paroi abdominale, hernie cicatricielle)</li><li>- <b>Ongle incarné, paronychie</b></li><li>- <b>Extraction d'ongles d'orteils</b></li><li>- <b>Abcès, furoncle</b> (incision et drainage)</li><li>- <b>Athérome, aussi infectée</b> (excision)</li><li>- <b>Verrues</b> (excision)</li><li>- <b>Lipome</b> (petite excision)</li><li>- <b>Naevus</b> (examen et excision)</li><li>- <b>Excision d'un échantillon pour l'histologie</b></li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Excision de corps étrangers</b></li> <li><b>Prescription de supports pour chaussures et autres orthèses</b></li> </ul>
--	--

## J. Psychisme

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Crainte, agitation, tension</b></li> <li>- <b>Réaction aiguë au stress</b> (p. ex. troubles d'adaptation, choc culturel, sentiment de stress, deuil, mal du pays, stress posttraumatique direct, choc psychique)</li> <li>- <b>Etat déprimé</b> (y c. sentiment d'insuffisance, de solitude, d'être malheureux, d'inquiétude)</li> <li>- <b>Sentiment ou comportement exacerbé, en colère</b> (y c. excitation, agitation)</li> <li>- <b>Sénilité, sentiment d'être vieux et comportement correspondant</b> (y c. préoccupation en raison de l'âge, senescence)</li> <li>- <b>Troubles du sommeil</b> (insomnie, cauchemars, apnée du sommeil, somnambulisme, somnolence)</li> <li>- <b>Demande sexuelle diminuée</b> (frigidité, perte de la libido)</li> <li>- <b>Plénitude sexuelle diminuée</b> (impotence d'origine non organique ou dyspareunie; éjaculation précoce; vaginisme d'origine psychique)</li> <li>- <b>Soucis pour cause d'inclinaisons sexuelles</b></li> <li>- <b>Bégaiements, balbutiements, tics</b></li> <li>- <b>Enurésie nocturne</b></li> <li>- <b>Troubles de la mémoire</b> (amnésie; trouble de la concentration; désorientation)</li> <li>- <b>Troubles du comportement chez les enfants</b> (phases de développement retardées; jalousie; hyperactivité; retard dans le développement du langage; accès de colère)</li> <li>- <b>Troubles du comportement à l'adolescence</b> (y c. criminalité de l'adolescent)</li> <li>- <b>Problèmes d'apprentissage spécifiques</b> (y c. légasthénie)</li> <li>- <b>Problèmes dans les différentes phases de la vie chez les adultes</b> (p.ex. syndrome du nid vide; midlife crisis; choc du départ à la retraite, burn-out)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie psychique</b> (chez un patient chez lequel une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction psychique subjectivement restreinte ou perturbée</b> (p.ex. fonction restreinte, perturbée en tant que résultat de troubles psychiques; manque de confiance en soi)</li> <li>- <b>Autres symptômes ou affections psychiques</b> (fantasmes, troubles du comportement alimentaire, hallucinations, troubles multiples de la personnalité, hygiène lacunaire, comportement étrange, méfiance)</li> </ul>
---	--

<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Abus du tabac</b> (par inhalation, tabac à mâcher, à sniffer)</li><li>- <b>Abus de médicaments</b></li><li>- <b>Abus de drogues</b> (addiction, désintoxication, traitement de substitution, p. ex. méthadone)</li><li>- <b>Troubles de l'alimentation dans toutes les catégories d'âge</b> (chez les enfants, problèmes pour les nourrir, comportements anormaux), <b>anorexie, boulimie nerveuse</b></li><li>- <b>Schizophrénie</b> (toutes sortes de schizophrénie, paranoïa)</li><li>- <b>Psychoses affectives</b> (trouble affectif bipolaire, hypomanie, manie, folie maniaco-dépressive)</li><li>- <b>Angoisses, oppression</b> (y c. névrose d'angoisse, attaques de panique)</li><li>- <b>Trouble de conversion/somatisation</b> (transformation d'affects refoulés en symptômes physiques, hypochondrie, hystérie, grossesse nerveuse)</li><li>- <b>Neurasthénie</b> (fatigue accrue avec sensations désagréables, difficulté à se concentrer et diminution constante des capacités et de l'organisation pratique du quotidien)</li><li>- <b>Phobie, obsession</b></li><li>- <b>Trouble de la personnalité</b> (trouble dissociatif de la personnalité, trouble de peur, d'évitement, paranoïde, schizoïde de la personnalité, syndrome de Münchhausen, syndrome de Hospital-hopper, trouble du comportement chez l'adulte)</li><li>- <b>Troubles hypercinétiques</b> (ADHS, attention inclusive lacunaire, hyperactivité)</li><li>- <b>Réaction de surcharge posttraumatique</b> (trouble d'adaptation posttraumatique)</li><li>- <b>Intelligence diminuée, retard mental</b></li><li>- <b>Autres troubles psychotiques</b> (p. ex. trouble psychotique aigu momentané, psychose réactive, psychose après un accouchement)</li><li>- <b>Autres troubles psychiques</b> (autisme, maladie mentale non spécifiée, névrose)</li></ul>
---	--

## K. Psychosomatique

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections psychosomatiques et/ou psychosociaux</b>, souvent non spécifiques, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécia-</p>	<p><b>Connaissances / savoir:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Critères diagnostiques de la <b>dépression majeure</b>. Red flags dans le diagnostic différentiel</li><li>- Examens basés sur un fondement scientifique, manière de procéder et possibilités thérapeutiques lors de <b>risque de suicide</b>.</li><li>- Critères diagnostiques de <b>troubles somatoformes</b>. Red flags dans le diagnostic différentiel de maladies somatiques. Examens et thérapies basés sur un fondement scientifique. Connaissances des facteurs de risque pour les troubles somatoformes.</li><li>- <b>Connaissances neurobiologiques</b> des liens entre un traumatisme ancien (abus sexuel ou autre, torture, etc.) et</li></ul>
---	---

listes:	<p>des troubles somatiques de peur ou du développement (Felitti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Savoir (sur le plan individuel) quand il faut envoyer un patient chez un psychiatre/psychothérapeute</li> <li>- <b>Troubles somatopsychiques</b> (réactions et développements psychiques à des maladies physiques graves)</li> <li>- <b>En général</b>: un trouble corporel peut cacher un problème psychique à l'origine des affections ou les aggraver</li> </ul> <p><b>Skills / Techniques / Aptitudes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Techniques basiques de communication</b>: techniques centrées sur le patient et le médecin (attendre, répéter, refléter, résumer)</li> <li>- <b>Exploration du concept du patient</b></li> <li>- <b>Modèle bio-psycho-social avec vulnérabilités spécifiques à différentes phases de la vie</b></li> <li>- <b>Entretien avec le patient dans des situations difficiles</b> (pensées suicidaires, sexualité, accompagnement en fin de vie, perte de personnes proches)</li> <li>- Techniques de la <b>prise de décision participative</b></li> <li>- Techniques du <b>comportement à adopter</b> face au patient <b>et de la manière de le persuader</b> (negociating)</li> <li>- <b>Motivational interviewing / cycle of change</b> (Prochaska DiClemente) pour la détection précoce, le conseil et le traitement, p.ex. lors d'addictions</li> <li>- Techniques d'<b>intervention en cas de crise</b> individuelle, professionnelle ou familiale</li> <li>- Techniques du <b>conseil (counseling)</b></li> <li>- Techniques pour le <b>setting à plusieurs personnes</b></li> <li>- Concept thérapeutique du <b>cercle vicieux créé par les angoisses</b></li> <li>- Examens basés sur l'évidence scientifique et manière de procéder en cas de <b>burn-out, d'épuisement</b></li> <li>- <b>Breaking bad news</b></li> </ul> <p><b>Relation médecin- patient:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Réflexion sur la relation médecin-patient</b> dans le cadre d'un <b>groupe Balint, de cercles vidéo</b> ou sous une autre <b>forme de supervision</b></li> <li>- Comment éveiller ma curiosité <b>pour le patient?</b></li> <li>- <b>Expérience personnelle minimale</b>, p. ex. par une supervision vidéo, expérience de groupe centrée sur le médecin (et non sur le patient).</li> <li>- Souci de soi (<b>prophylaxie</b> individuelle du <b>burn-out</b>)</li> </ul>
---------	--

## L. Maladies infectieuses

...peut, pour ces <b>maladies infectieuses</b> , effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiel-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pandémies tel que virus H1N1, ...</b></li> <li>- <b>Rougeole et ses complications</b></li> <li>- <b>Oreillons et ses complications</b></li> <li>- <b>Rubéole et ses complications, rubéole congénitale</b></li> <li>- <b>Varicelle et ses complications</b></li> </ul>
---	--

<p>lement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens, le traitement et la prophylaxe ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Exanthème dû à d'autres virus</b> (fièvre avec exanthème, érythème infectieux, fièvre de trois jours)</li> <li>- <b>Autres maladies virales</b> (comme l'adénovirus; vaccine; maladies dues au coxsackie)</li> <li>- <b>Autres maladies infectieuses</b> (infections non localisées; maladie de Lyme; infections méningocoques; mycoplasma; fièvre Q; scarlatine;</li> <li>- <b>Gonorrhée</b> (toutes les localisations)</li> </ul>
---	---

## M. Neurologie

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Maux de tête</b> (y c. sensation de douleurs dans la tête; douleurs posttraumatiques)</li> <li>- <b>Douleurs faciales</b></li> <li>- <b>Restless legs</b></li> <li>- <b>Picotements dans les doigts de la main, dans les pieds ou dans les orteils</b> (y c. sensation de brûlure et de piquûre)</li> <li>- <b>Autres troubles de la sensibilité</b> (anesthésie, hypasthésie, paresthésie, dysesthésie)</li> <li>- <b>Convulsions, crampes</b> (y c. crampe fébrile, crises convulsives)</li> <li>- <b>Mouvements involontaires anormaux</b> (dystonie, mouvements dorsaux, myoclonie; crampes aux épaules; spasmes; tétanie; trémor; convulsions)</li> <li>- <b>Trouble de l'odorat ou du goût</b> (y c. anosmie)</li> <li>- <b>Vertiges, torpeur</b> (y c. sensation de faiblesse, perte de l'équilibre, convulsion, sensation de chanceler)</li> <li>- <b>Paralysie ou faiblesse musculaire</b> (y c. parésie)</li> <li>- <b>Trouble du langage</b> (aphasie; dysphasie; dysarthrie; parler incompréhensible)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou d'une autre maladie du système nerveux</b> (p.ex. sclérose en plaques ou maladie de Parkinson chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction nerveuse subjectivement restreinte ou perturbée</b> (y c. trouble ou paralysie neurologique)</li> <li>- <b>Autres symptômes ou troubles du système nerveux</b> (démarche anormale; claudication; ataxie, méningisme)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Malformations du crâne</b></li> <li>- <b>Lésions du système nerveux</b> (lésion, douleur fantôme)</li> <li>- <b>Anomalie génétique du système nerveux</b> (hydrocéphale, spina bifida)</li> <li>- <b>Céphalée de tension</b></li> <li>- <b>Paralysie faciale, phénomènes de Bell</b></li> <li>- <b>Névralgie du trijumeau</b> (y c. tic douloureux)</li> <li>- <b>Syndrome du tunnel carpien et tarsal</b></li> <li>- <b>Autres affections neurologiques</b> (paralysie centrale, sclérose latérale amyotrophique, motor neuron disease, myasthenia gravis, névralgie, polyneuropathies, polyradiculite)</li> </ul>



## N. Glandes endocrines, métabolisme, alimentation

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Absorption exagérée de boissons</b> (polydipsie)</li> <li>- <b>Appétit exagéré</b> (alimentation exagérée, polyphagie)</li> <li>- <b>Manque d'appétit</b> (anorexie)</li> <li>- <b>Problèmes d'alimentation chez l'enfant/petit enfant</b> (y compris ce qui est donné à manger et comment)</li> <li>- <b>Problèmes d'alimentation chez l'adulte</b> (y compris ce qui est donné à manger et comment)</li> <li>- <b>Prise de poids</b></li> <li>- <b>Perte de poids</b> (y c. cachexie)</li> <li>- <b>Troubles de la croissance</b> (retard dans le développement, troubles de la croissance consécutifs à des causes physiologiques)</li> <li>- <b>Déshydratation</b> (manque d'eau/dessèchement)</li> <li>- <b>Peur d'une maladie cancéreuse ou peur d'une maladie du système endocrinien</b> (chez un patient chez qui une telle maladie n'est pas décelée.)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des glandes endocrines ou du métabolisme</b></li> <li>- <b>Autres symptômes ou affections des glandes endocrines, du métabolisme et de l'alimentation</b> (faim dévorante pour certains produits, poids insuffisant)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Anomalie génétique dans le domaine endocrinien et le métabolisme</b> (nanisme, crétinisme)</li> <li>- <b>Obésité</b> (indice de masse corporelle supérieur à 30)</li> <li>- <b>Embonpoint</b> (indice de masse corporelle entre 25 et 30)</li> <li>- <b>Carence alimentaire en vitamines</b> (carence minérale due à l'alimentation, manque de fer sans anémie, sous-alimentation, marasme, scorbut)</li> <li>- <b>Goutte</b></li> <li>- <b>Troubles du métabolisme</b> (hyperlipidémie; anomalies de la lipoprotéine; taux élevé de cholestérol et de triglycérides; xanthome)</li> <li>- <b>Autres maladies du domaine endocrinien, du métabolisme ou de l'alimentation</b> (amyloïdose, arthropathies cristallines, puberté précoce ou tardive; pseudogoutte; glycosurie rénale)</li> </ul>

## O. Sang, organes hématopoïétiques et système immunitaire

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nodules lymphatiques volumineux ou douloureux</b> (adénopathie lymphatique avec ou sans douleur ou sensibilité à la pression, localisée, généralisée)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des organes hématopoïétiques ou du système immunitaire</b></li> <li>- <b>Crainte d'une maladie maligne ou d'une autre maladie du sang, de la lymphe ou des nodules lymphatiques</b></li> </ul>
--	--

tement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:	(chez un patient chez qui la maladie n'est pas décelée) - <b>Saignements</b> - <b>Crainte du virus du Sida /HIV</b> (chez un patient chez qui la maladie n'est pas décelée)
...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b> , effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:	- <b>Lymphadénite aiguë et autre</b> (y c. abcès des nodules lymphatiques et lymphadénite mésentérique) - <b>Anémies hémolytes génétiques</b> (anémie cellulaire selon Sichel, signes caractéristiques de l'anémie cellulaire selon Sichel, sphérocytose, thalassémie) - <b>Leucytes anormaux</b> (agranulocytose inexpliquée, eosinophilie, leucocytose, lymphocytose, neutropénie) - <b>Splenomégalie</b> - <b>Autres maladies dans le domaine sanguin / lymphatique / splénique</b> (maladie auto-immune; défauts du complément; hypersplénie; faiblesse immunitaire; autres anomalies hématologiques; vitesse de sédimentation élevée; anomalies des globules rouges)

## P. Urologie / Organes urinaires

...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b> , effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:	- <b>Dysurie, douleur ou brûlure lors de la miction</b> - <b>Besoin fréquent d'uriner</b> (y c. miction nocturne, miction fréquente) - <b>Incontinence urinaire</b> (énurésie, perte involontaire d'urine, incontinence due au stress) - <b>Autres problèmes lors de la miction</b> (y c. anurie, oligurie, miction goutte à goutte) - <b>Hématurie</b> (constat macroscopique ou microscopique ou test chimique positif) - <b>Autres affections ou symptômes de la vessie</b> (p.ex. urine sentant mauvais, urine foncée) - <b>Comportement urinaire</b> - <b>Autres symptômes et affections de la vessie</b> (vessie délicate, douleurs à la vessie) - <b>symptômes et affections des reins</b> (p. ex douleurs dans les reins, problèmes rénaux, coliques rénales) - <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou autres maladies des organes rénaux</b> (chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée) - <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des organes rénaux</b>
...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b> , effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients	- <b>Urétrite</b> (y c. urétrite par des chlamydia, urétrite non spécifique, méatite) - <b>Néoformation bénigne dans les organes rénaux</b> (papillome dans la vessie, polype dans les voies urinaires) - <b>Lésions des organes rénaux</b> (y c. contusion rénale, corps étranger dans les organes rénaux) - <b>Anomalie génétique des organes rénaux</b> (reins à double, urètre à double; rein kystique) - <b>Albuminurie ou protéinurie orthostatique ou lordo-</b>

de manière ciblée chez d'autres spécialistes:	<p><b>tique</b> (protéinurie due à la position couchée)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Test urinaire anormal</b> (p.ex. glycosurie, protéinurie, leucocyturie, pyurie)</li> <li>- <b>Autres maladies des organes rénaux</b> (diverticule vésical, hydronéphrose, hypertrophie rénale, obstruction vésicale; kystes rénaux; anthrax dans les voies urinaires, stricture de l'urètre; reflux urétéral, urémie)</li> </ul>
---	--

## Q. Grossesse, naissance, planning familial

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Grossesse supposée mais non encore confirmée</b> (arrêt des règles ou symptômes typiques d'une grossesse)</li> <li>- <b>Crainte d'une grossesse</b> (souci concernant la possibilité d'une grossesse non désirée)</li> <li>- <b>Pertes de sang, saignements au cours de la grossesse</b> (saignement vaginal au cours de la grossesse)</li> <li>- <b>Nausée, vomissements pendant la grossesse</b> (hyperémésis, nausée matinale)</li> <li>- <b>Contraception post-coïtale</b> (pilule du lendemain), <b>orale</b> (planning familial au moyen d'une hormonothérapie orale), <b>intra-utérine</b> (planning familial au moyen d'un stérilet intra-utérin / d'une spirale), <b>intra vaginale</b> (planning familial au moyen d'une barrière intra vaginale chimique ou mécanique), <b>transdermale ou intradermale</b>)</li> <li>- <b>Conseil concernant la stérilisation</b> (planning familial par la stérilisation de la femme ou de l'homme)</li> <li>- <b>Stérilité, fécondité réduite</b> (stérilité primaire et secondaire)</li> <li>- <b>Saignement postpartum</b></li> <li>- <b>Autres symptômes et affections après la naissance</b></li> <li>- <b>Symptômes et douleurs lors de l'allaitement</b> (galactorrhée, sevrage, problèmes lors de la désaccoutumance)</li> <li>- <b>Souci concernant l'apparence extérieure pendant ou après la grossesse</b></li> <li>- <b>Crainte de complications pendant la grossesse</b> (y c. le conseil sexuel durant la grossesse, crainte de malformations chez le nouveau-né et de complications chez une patiente chez qui le diagnostic n'est pas décelé)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée durant la grossesse</b> (y c. handicap comme conséquence ou en lien avec une grossesse, bassin instable)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Infection puerpérale, septicémie puerpérale</b></li> <li>- <b>Complication de la grossesse par une infection</b></li> <li>- <b>Complication de la grossesse suite à une lésion</b> (y c. conséquences d'une lésion compliquant la grossesse)</li> <li>- <b>Grossesse normale</b></li> <li>- <b>Grossesse non désirée</b></li> <li>- <b>Grossesse ectopique, EUG</b></li> <li>- <b>Toxicose de la grossesse</b> (p. ex. éclampsie, hypertonie, œdème, protéinurie lors de la grossesse; prééclampsie)</li> <li>- <b>Avortement spontané</b> (fausse couche; avortement me-</li> </ul>

d'autres spécialistes:	<p>naçant, complet, incomplet, avortement habituel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Avortement provoqué</b> (interruption de la grossesse, toutes les complications)</li> <li>- <b>Naissance précoce</b> (c.-à-d. naissance d'un bébé en vie après moins de 37 semaines de grossesse)</li> <li>- <b>Grossesse à risque</b> (première naissance à un âge avancé; anémie au cours de la grossesse; diabète ou autre maladie chronique déjà existante et qui pourrait nuire à la grossesse, bassin étroit; hydramnion; position anormale du fœtus; grossesse pluri-embryonnaire; placenta praevia; ancienne césarienne)</li> <li>- <b>Diabète au cours de la grossesse</b> (y c. diabète qui apparaît durant la grossesse)</li> <li>- <b>Mastite puerpérale</b> (y c. abcès au sein)</li> <li>- <b>Autres affections mammaires durant la grossesse ou les couches</b> (p. ex. crevasses aux mamelons)</li> <li>- <b>Autres complications durant les couches</b></li> </ul>
------------------------	---

## R. Organes sexuels féminins

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patientes de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs dans la région génitale</b> (douleurs dans le bassin, dans la vulve)</li> <li>- <b>Douleurs lors des règles</b> (y c. dysménorrhée)</li> <li>- <b>Douleurs au milieu du mois</b> (douleurs du mitan, douleurs dues à l'ovulation)</li> <li>- <b>Relations sexuelles douloureuses chez la femme</b> (dyspareunie, vaginisme)</li> <li>- <b>Règles perturbées (menstruation inexistante ou très rare</b> (aménorrhée [primaire, secondaire], règles retardées, oligoménorrhée), <b>menstruation excessive</b> (ménorragie, aussi durant la puberté), <b>menstruation irrégulière ou trop fréquente</b> (polyménorrhée)</li> <li>- <b>Saignements en dehors des règles</b> (saignement, saignement dysfonctionnel de la matrice, métrorragie, saignement lors de l'ovulation, «spotting»)</li> <li>- <b>Symptômes et affections pré- et périmenstruels</b> (tous les symptômes en lien avec la période prémenstruelle)</li> <li>- <b>Report des règles</b> (report de la menstruation régulière attendue par un traitement à base d'hormones)</li> <li>- <b>Symptômes/affections en lien avec la ménopause</b> (y c. symptômes résultant de la ménopause; colpitis atrophique, colpitis sénile)</li> <li>- <b>Saignement après la ménopause</b></li> <li>- <b>Saignement post-coïtal</b> (y c. saignement lors des relations sexuelles)</li> <li>- <b>Ecoulement hors du vagin</b> (fluor vaginalis, leucorrhée)</li> <li>- <b>Autres symptômes et affections dans le vagin</b> (y c. sécheresse)</li> <li>- <b>Symptômes et affections à la vulve</b> (p. ex. démangeaisons à la vulve, sécheresse de la vulve)</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Symptômes et affections dans le bassin</b></li> <li>- <b>Douleurs aux seins</b> (mastodynie)</li> <li>- <b>Nodules ou masse tissulaire aux seins</b> (p. ex. mastopathie kystique)</li> <li>- <b>Symptômes et affections aux mamelons</b> (p. ex. écoulement à partir des mamelons, crevasses, douleurs, prurit, rétraction)</li> <li>- <b>Autres symptômes et affections des seins</b> (p.ex. mastite, mastopathie simple, galactorrhée)</li> <li>- <b>Soucis concernant l'apparence du sein</b> (y c. conseils sur l'augmentation ou la réduction des seins)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie vénérienne</b> (chez une patiente chez qui une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Crainte d'une disfonction sexuelle</b> (chez une patiente chez qui une disfonction n'existe pas)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse des organes génitaux</b> (chez une patiente chez qui une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Crainte d'un cancer au sein</b> (chez une patiente chez qui le diagnostic n'est pas détecté)</li> <li>- <b>Crainte d'une autre maladie génitale ou mammaire</b> (chez une patiente chez qui une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des organes génitaux</b></li> <li>- <b>Autres symptômes et affections dans la région génitale</b> (p. ex. écoulement depuis les voies vésicales)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patientes de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Trichomoniose dans la région génitale</b></li> <li>- <b>Herpès génital</b> (y c. herpès simplex anogénital)</li> <li>- <b>Condylomata acuminata</b> (verrues vénériennes, infection virale par le papillome humain)</li> <li>- <b>Infection chlamydienne des organes génitaux</b></li> <li>- <b>Autre colpite ou vulvite</b> (p. ex. infection Gardnerella du vagin)</li> <li>- <b>Autre néoformation maligne dans la région des organes génitaux</b> (néoformations malignes aux annexes, aux ovaires, à l'utérus, au vagin, à la vulve)</li> <li>- <b>Fibromyome de l'utérus</b> (y c. utérus fibroïde, fibromyome du col de l'utérus, myome)</li> <li>- <b>Néoformation bénigne au sein</b> (y compris fibroadénome)</li> <li>- <b>Maladie fibrokystique du sein</b> (maladie kystique chronique du sein, fibroadénose kystique du sein, dysplasie du sein, kystes épars au sein)</li> <li>- <b>Néoformation dans les organes génitaux</b></li> <li>- <b>Lésions dans la région génitale</b> (y c. corps étrangers dans le vagin, excision)</li> <li>- <b>Anomalie génétique des organes génitaux</b> (p. ex. hermaphrodite, hymen imperforatum)</li> <li>- <b>Autres maladies du col de l'utérus</b> (érosion de la portio, leucoplasie utérale; cervicite; polype à la muqueuse utérine; ancienne lacération du col de l'utérus)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Frottis Papanicolaou anormal</b></li> <li>- <b>Incident utérovaginal</b> (cystocèle, rectocèle, procidentia)</li> <li>- <b>Syndrome prémenstruel ou périmenstruel</b></li> <li>- <b>Autres maladies des organes génitaux</b> (kyste de Bartholin ou abcès de Bartholin; polype à l'endomètre; fistule dans la région génitale; pelvipathie, kyste ovarien physiologique)</li> </ul>
--	---

## S. Organes sexuels masculins

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs dans le pénis</b></li> <li>- <b>Douleurs dans les testicules ou dans le scrotum</b> (y c. le périnée, bassin)</li> <li>- <b>Écoulement à partir de l'urètre</b></li> <li>- <b>Spermes ensanglantés</b></li> <li>- <b>Autres symptômes et affections du pénis ou du prépuce</b></li> <li>- <b>Autres symptômes et affections des testicules et du scrotum</b> (y c. modifications tumorales)</li> <li>- <b>Symptômes et affections de la prostate</b> (y c. hyperplasie de la prostate)</li> <li>- <b>Impotence</b></li> <li>- <b>Autres symptômes et affections concernant les fonctions sexuelles masculines</b> (p. ex. érection douloureuse, priapisme)</li> <li>- <b>Stérilité ou fécondité réduite chez l'homme</b></li> <li>- <b>Demande d'un conseil pour le planning familial par la stérilisation de l'homme, vasectomie</b></li> <li>- <b>Demande d'un conseil de la part de l'homme concernant d'autres méthodes de planning familial</b></li> <li>- <b>Symptômes et affection du sein masculin</b> (p. ex. nodules dans le sein masculin, gynécomastie)</li> <li>- <b>Souci de l'apparence extérieure, forme et grandeur du pénis</b></li> <li>- <b>Crainte d'un dysfonctionnement sexuel</b> (chez un homme chez qui ce dysfonctionnement n'existe pas)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie vénérienne</b> (chez un homme chez qui une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou autre maladie des organes génitaux</b> (chez un patient chez qui une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des organes génitaux</b></li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un trai-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Herpès génital</b> (herpes anogénital et herpes non génital)</li> <li>- <b>Balanite</b> (p.ex. candidose du gland du pénis)</li> <li>- <b>Condylomata acuminata</b> (condylome acuminé, infection virale par le papillome humain)</li> <li>- <b>Orchite, épидидymite</b></li> <li>- <b>Inflammation de la prostate et de la vésicule séminale</b></li> <li>- <b>Néoformation maligne à la prostate, gestion de la détermination de l'APS basée sur l'évidence</b></li> </ul>



<p>tement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autres néoformations malignes aux organes génitaux et au sein masculin</b> (testicules, séminome, carcinome du pénis, carcinome du sein masculin)</li> <li>- <b>Néoformation bénigne aux organes génitaux et au sein masculin</b></li> <li>- <b>Lésion des organes génitaux</b> (y c. circoncision)</li> <li>- <b>Phimose, préputium</b> (y c. paraphimose)</li> <li>- <b>Hypospadié</b></li> <li>- <b>Testicules surélevées, rétention testiculaire et cryptorchidisme</b></li> <li>- <b>Autres anomalies congénitales des organes génitaux</b> (p.ex. hermaphroditisme, testicules rétractiles)</li> <li>- <b>Hyperplasie bénigne de la prostate</b> (y c. fibrome, hyperplasie, syndrome du lobe moyen, impraticabilité de la prostate, mégalie de la prostate)</li> <li>- <b>Hydrocèle</b></li> <li>- <b>Autres maladies</b> des organes génitaux et du sein masculin (y c. kyste épидидymal, spermatocele, varicocele, torsion des testicules)</li> </ul>
---	--

## T. Oreilles

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs aux oreilles</b></li> <li>- <b>Problèmes d'ouïe</b></li> <li>- <b>Tinnitus (acouphène), bruissement d'oreille, bourdonnement d'oreilles</b> (y c. écho dans l'oreille)</li> <li>- <b>Troubles de l'équilibre</b> (vertiges)</li> <li>- <b>Écoulement de l'oreille</b></li> <li>- <b>Saignement d'oreille</b> (sang dans ou sortant de l'oreille)</li> <li>- <b>Sensation de l'oreille bouchée</b> (oreille déplacée ou bloquée)</li> <li>- <b>Soucis concernant l'apparence extérieure des oreilles</b></li> <li>- <b>Crainte d'une maladie des oreilles</b> (p.ex. crainte de devenir sourd chez un patient chez qui cette affection n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée des organes auditifs</b> (faiblesse auditive à une oreille, perte auditive momentanée; crissements ou détonations dans l'oreille)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Otite moyenne aiguë, otite moyenne sécrétoire</b></li> <li>- <b>Catarrhe de la trompe d'Eustache</b> (trompe bouchée, catarrhe ou dysfonctionnement des conduits d'Eustache, y compris drainage tympanique)</li> <li>- <b>Otite moyenne chronique</b> (p.ex. cholestéatome, otite moyenne chronique purulente, mastoïdite)</li> <li>- <b>Néoformation dans l'oreille</b> (formes bénignes et formes malignes)</li> <li>- <b>Corps étranger dans l'oreille</b></li> <li>- <b>Perforation du tympan</b></li> <li>- <b>Autres lésions de l'oreille</b> (conduit auditif externe, pavil-</li> </ul>

	<p>lon de l'oreille, tympan par blessure ou pression)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Anomalie génétique des oreilles</b> (oreilles décollées)</li> <li>- <b>Cérum surabondant</b></li> <li>- <b>Syndrome de vertige</b> (vertige bénin, paroxystique et dépendant de la position; labyrinthite; maladie de Menière; névrite vestibulaire)</li> <li>- <b>Traumatisme de l'ouïe</b> (surdité par traumatisme sonore)</li> <li>- <b>Surdité</b> (faiblesse auditive ou surdité des deux oreilles, surdité congénitale)</li> <li>- <b>Autres maladies des oreilles ou processus mastoïdien</b> (p.ex. polypes dans l'oreille moyenne, etc.)</li> </ul>
--	---

## U. Yeux

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Douleurs aux yeux</b></li> <li>- <b>Yeux rouges</b> (œil rempli de sang, œil enflammé)</li> <li>- <b>Sécrétions oculaires</b> (larmes, pus, œil qui coule)</li> <li>- <b>Apparitions entoptiques</b> (mouches volantes, taches au niveau du visage, stationnaires ou se multipliant)</li> <li>- <b>Autres troubles de la vue</b> (vision floue; difficultés à lire; images à double; surmenage des yeux; crainte de la lumière; scotome et éblouissements, cécité passagère; faiblesse oculaire)</li> <li>- <b>Sensibilité anormale de l'œil</b> (brûlures; sécheresse; démangeaisons)</li> <li>- <b>Mouvements oculaires anormaux</b> (clignements anormaux, inertie oculaire, nystagmus)</li> <li>- <b>Apparence anormale de l'œil</b> (modification de sa couleur; gonflements, larmolements)</li> <li>- <b>Symptôme ou affection à la paupière</b> (y c. ptôse de la paupière)</li> <li>- <b>Symptôme ou affection en raison du port de lunettes ou de lentilles de contact</b> (problèmes concernant la structure, le fonctionnement ou la sensibilité de l'œil)</li> <li>- <b>Crainte d'une maladie ophtalmique</b> (y c. crainte de perdre la vue chez un patient chez qui une telle maladie n'est pas décelée)</li> <li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée d'un œil ou des yeux</b> (cécité dans un œil; handicap consécutif à un problème ophtalmique ou de vision)</li> </ul>
<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Conjonctivite allergique</b> (avec ou sans rhinorrhée)</li> <li>- <b>Autres infections ou inflammations des yeux</b> (dacryocystes; herpès simplex de l'œil, inflammation de la cavité oculaire; irite; iridocyclites; kératite)</li> <li>- <b>Néof ormation dans l'œil et ses appendices</b> (néof ormation bénigne et maligne)</li> <li>- <b>Contusion ou saignement dans l'œil</b> (p.ex. œil au beurre noir; hyphème; saignement sous-conjonctivite)</li> <li>- <b>Autres lésions oculaires</b> (erosio corneae; brûlure, cécité des neiges; cécité due au coup d'arc lors de soudures)</li> </ul>

d'autres spécialistes:	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Occlusion du canal lacrymal chez le petit enfant</b></li><li>- <b>Anomalie congénitale des yeux</b> (colobome, etc.)</li><li>- <b>Soupçon d'une rétinopathie</b> (consécutive à un diabète, une hypertension ou une autre maladie)</li><li>- <b>Ulcus corneae</b> (ulcus dendriticum; kératite virale)</li><li>- <b>Pterygium</b></li><li>- <b>Défaut de réfraction</b> (astigmatisme; hypermétropie; presbytie; myopie; presbyopie)</li><li>- <b>Cécité</b> (partielle ou complète des deux yeux)</li><li>- <b>Strabisme</b> (p. ex. patient qui louche; exophorie)</li><li>- <b>Problèmes aux paupières et périorbitaux</b></li><li>- <b>Autres affections des yeux et de leurs appendices</b> (amblyopie; arcus senilis; daltonisme; opacification de la cornée; affections des cavités oculaires; ectropion; entropion; épisclérite; trichiasis; héméralopie; œdème papillaire; sclérite; etc.)</li></ul>
------------------------	--

## V. Peau

...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b> , effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Douleurs ou sensibilité de la peau à la pression</b> (y c. brûlures)</li><li>- <b>Prurit</b></li><li>- <b>Nodules ou enflures, de manière locale ou généralisée</b> (y c. papules, bubons ou enflures à plusieurs endroits)</li><li>- <b>Exanthème local ou généralisé</b> (taches, érythème, rougeurs à plusieurs endroits)</li><li>- <b>Modification de la couleur de la peau</b> (y c. cernes sous les yeux, cyanose, rougeurs, grains de beauté, pâleur, défaut de pigmentation)</li><li>- <b>Cors au pied, callosités</b></li><li>- <b>Autres symptômes et affections cutanées</b> (peau sèche, épidermolyse, formation de pellicules, rides)</li><li>- <b>Symptômes et affections des ongles</b> (y c. ongle hippocratique)</li><li>- <b>Symptômes et affections capillaires et du cuir chevelu</b> (cuir chevelu desséché)</li><li>- <b>Crainte d'une maladie cancéreuse ou d'une autre maladie de la peau</b> (chez un patient chez qui l'une de ces maladies n'est pas décelée)</li><li>- <b>Fonction subjectivement restreinte ou perturbée de la peau</b> (y c. handicap pour cause d'affection cutanée)</li><li>- <b>Autres symptômes et affections dans le domaine de la peau</b> (saignement cutané, cellulite, pétéchie, problèmes au nombril, plaie ouverte)</li></ul>
---	---

<p>...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Infection à un doigt ou à un orteil</b> (y c. paronychie)</li> <li>- <b>Morsure d'insecte, piqûre d'insecte</b></li> <li>- <b>Gale et autres maladies acariennes</b></li> <li>- <b>Poux, puces, tiques</b></li> <li>- <b>Dermatophytose</b> (y c. onychomycose, pityriasis versicolore, teigne)</li> <li>- <b>Lipome</b></li> <li>- <b>Néoforations bénignes dans la région cutanée</b> (morbus Bowen, kyste dermoïde, précancéroses)</li> <li>- <b>Affections cutanées dues à des radiations</b> (coup de soleil, photosensibilité, photo-exanthème polymorphe)</li> <li>- <b>Hémangiome et lymphangiome</b> (y c. naevus flammeus)</li> <li>- <b>Anomalies cutanées congénitales</b> (ichtyose)</li> <li>- <b>Kyste dermoïde sacral ou pilonidal, fistule et abcès pilonidal</b></li> <li>- <b>Dermatite séborrhéique</b></li> <li>- <b>Dermatite de contact, dermatite allergique</b></li> <li>- <b>Eczéma dû aux langes, dermatite due aux langes, intertrigo</b></li> <li>- <b>Pityriasis rosea</b></li> <li>- <b>Psoriasis</b></li> <li>- <b>Affections des glandes sudoripares</b> (dyshidrose, hidradénite)</li> <li>- <b>Athérome</b></li> <li>- <b>Ongle incarné, paronychie</b></li> <li>- <b>Molluscum contagiosum</b></li> <li>- <b>Urticaire</b></li> <li>- <b>Autres affections cutanées</b> (dermatite artefacta, lupus érythémateux discoïde, érythème multiforme, granulome, granuloma anulare, hyperkératose, chéloïde, kérato-acanthome; lichen planus, neurodermatite, onychogrypose, acné rosacée, rhinophyma, cicatrices, verrues séborrhéiques ou séniles, striae atrophicae, vitiligo)</li> </ul>
---	--

## W. Pédiatrie

<p>...peut, pour ces <b>symptômes et affections</b>, effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôles de routine et vaccinations du nourrisson et de l'enfant</li> <li>- Nourrisson qui crie, petit enfant irritable de façon générale (pleurs trop fréquents, agitation)</li> <li>- Nourrisson hypotonique, atonique</li> <li>- Plaies chez le nourrisson</li> <li>- Problèmes d'allaitement</li> <li>- Refus de manger et de boire chez le nourrisson et l'enfant</li> </ul>
---	---

...peut, pour ces <b>maladies et diagnostics</b> , effectuer une première évaluation avec les moyens à sa disposition, détecter les situations potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour des examens et un traitement ou envoyer les patients de manière ciblée chez d'autres spécialistes:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Troubles du développement chez le nourrisson et l'enfant</li><li>- Enurésie chez le nourrisson et l'enfant</li><li>- Troubles de la croissance (claudication / douleurs)</li><li>- Retard, retard du développement moteur, intellectuel</li><li>- Croissance anormale: nanisme, gigantisme</li><li>- Mort soudaine de l'enfant</li><li>- Puberté précoce / attardée</li><li>- Enfant hyperactif</li></ul>
---	---

## X. Evaluation médicale de l'aptitude à la conduite

...peut évaluer l'impact de l'état de santé et des maladies sur l'aptitude à la conduite des seniors de 70 ans et plus et réaliser l'examen périodique de l'aptitude à la conduite pour le compte de l'office de la circulation routière	<p>Peut examiner et apprécier l'aptitude à la conduite en cas de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- toutes les maladies physiques, en particulier neurologiques et cardiovasculaires, ainsi que maladies métaboliques et de l'appareil locomoteur</li><li>- maladies psychiques</li><li>- troubles sensoriels</li><li>- troubles de la vigilance</li><li>- restrictions cognitives</li><li>- effets secondaires de médicaments, et plus particulièrement en cas de polymédication</li></ul> <p>Peut conseiller les patients en cas de renoncement provisoire à la conduite ou de perte définitive de l'aptitude à la conduite.</p> <p>Peut réaliser de manière compétente l'examen périodique de l'aptitude à la conduite chez les seniors de 70 ans et plus pour le compte de l'office cantonal de la circulation routière.</p> <p>Connaît les voies administratives dans le cas où le patient ne respecte pas les instructions et sait gérer les éventuels conflits.</p> <p>Connaît les conflits d'intérêts potentiels entre sa fonction de médecin de famille et de médecin ayant un mandat légal et sait les gérer.</p>
--	---